

## 과학탐구 영역(화학 II)

제 4 교시

성명


수험 번호

3

제 [ ] 선택

1


1. 그림 (가)는 한쪽 끝이 막힌 J자관에  $\text{Ne}(g)$  150 mL가 들어 있는 모습을, (나)는 (가)의 J자관에 수은을 추가한 후의 모습을 나타낸 것이다. (나)에서 수은 기둥의 높이 차는  $h$  mm이다.



$h$ 는? (단, 대기압은 760 mmHg이고, 온도는 일정하며 수은의 증기 압력은 무시한다.)

- ① 64    ② 80    ③ 88    ④ 90    ⑤ 100


2. 다음은 실생활에서 일어나는 2가지 현상이다.



- ① 과정의 엔탈피 변화( $\Delta H_1$ )와 ② 과정의 엔탈피 변화( $\Delta H_2$ )의 부호 또는 값으로 옳은 것은?

$\frac{\Delta H_1}{①} +$	$\frac{\Delta H_2}{②} +$	$\frac{\Delta H_1}{③} -$	$\frac{\Delta H_2}{④} +$	$\frac{\Delta H_1}{⑤} +$	$\frac{\Delta H_2}{0}$
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

3. 그림은 고체 (가) ~ (다)의 결정 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은?

&lt;보기&gt;

- ㄱ. (가)는 분자 결정이다.  
ㄴ. 1 atm에서 녹는점은 (가) > (나)이다.  
ㄷ. (가) ~ (다) 중 전기 전도성은 (다)가 가장 크다.

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄱ, ㄷ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


4. 다음은 A의 분자량을 구하기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) A( $g$ )가 들어 있는 가스통의 질량을 측정하였더니  $w_1$  g 이었다.

(나) 그림 I과 같이 A( $g$ )를 눈금 실린더에 포집한 후, 가스통의 질량을 측정하였더니  $w_2$  g이었다.

(다) 그림 II와 같이 눈금 실린더 안과 밖의 수면 높이가 같아지도록 맞추고, 눈금 실린더 속 기체의 부피를 측정하였더니  $V$  L이었다.



(라) 대기압과 수조 속 물의 온도를 측정하였더니  $P_1$  atm,  $T$  K 이었고,  $T$  K에서의 수증기압을 조사하였더니  $P_2$  atm이었다.

I, II에서의 A( $g$ )의 압력 비교(㉠)와 이 실험으로부터 구한 A의 분자량(㉡)으로 옳은 것은? (단, 대기압과 온도는 일정하고, 기체 상수는  $R$  atm·L/mol·K이며, 물에 대한 A( $g$ )의 용해는 무시한다.)

[3점]

㉠	㉡	㉠	㉡
① I > II	$\frac{(w_1 - w_2)RT}{P_1 V}$	② II > I	$\frac{(w_1 - w_2)RT}{P_1 V}$
③ I > II	$\frac{(w_1 - w_2)RT}{(P_1 - P_2)V}$	④ II > I	$\frac{(w_1 - w_2)RT}{(P_1 - P_2)V}$
⑤ I > II	$\frac{w_1 RT}{P_1 V}$		

5. 다음은 물질 (가) ~ (다)에 대한 자료이다. (가) ~ (다)는  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{OF}_2$ 를 순서 없이 나타낸 것이다.

- 액체 상태에서 (가) 분자 사이에 쌍극자·쌍극자 힘이 존재한다.  
○ 분자량은 (나) > (다)이다.  
○ 기준 끓는점은 (다) > (나)이다.

(가) ~ (다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은? (단, H, O, F의 원자량은 각각 1, 16, 19이다.)

&lt;보기&gt;


- ㄱ. (나)는  $\text{O}_2$ 이다.  
ㄴ. 액체 상태에서 (가) 분자 사이에 수소 결합이 존재한다.  
ㄷ. 액체 상태에서 분자 사이에 분산력이 존재하는 물질은 1가지이다.

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄱ, ㄷ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 2 (화학 II)

## 과학탐구 영역

6. 그림은 20°C에서 A와 B가 각각 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이고, 표는 물질 ①과 ②의 온도와 증기 압력을 나타낸 것이다. ①과 ②은 A(l)와 B(l)를 순서 없이 나타낸 것이다.



물질	온도 (°C)	증기 압력 (mmHg)
①	20	400
②	60	400

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B의 온도에 따른 증기 압력 곡선은 교차하지 않는다.)

<보기>

- ㄱ. 분자 간 인력은 A(l)가 B(l)보다 크다.
- ㄴ. 외부 압력이 760 mmHg일 때, ②의 끓는점은 60°C보다 높다.
- ㄷ. ①은 A(l)이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 표는 금속 M의 서로 다른 온도에서의 결정 구조 (가)와 (나)에 대한 자료이다. (가)와 (나)는 면심 입방 구조와 체심 입방 구조를 순서 없이 나타낸 것이다.

결정 구조	(가)	(나)
단위 세포 모형과 단위 세포의 면		


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, M은 임의의 원소 기호이고, 단위 세포의 꼭짓점은 원자의 중심에 위치하며, (나)의 단위 세포 모형에 원자는 나타내지 않았다.)

<보기>

- ㄱ. (가)는 체심 입방 구조이다.
- ㄴ. ②은 ①으로 적절하다.
- ㄷ. 단위 세포의 질량은 (나)가 (가)의 2배이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식이다.




25°C, 1 atm에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 25°C, 1 atm에서  $\text{H}_2(g)$ ,  $\text{Cl}_2(g)$ 의 생성 엔탈피는 0이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. 1 mol의 엔탈피는  $\text{HCl}(g) > \text{HCl}(l)$ 이다.
- ㄴ. 2 mol의  $\text{HCl}(l)$ 는 기화할 때 18 kJ의 열을 흡수한다.
- ㄷ.  $\text{HCl}(l)$ 의 생성 엔탈피는  $-101 \text{ kJ/mol}$ 이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 1 atm에서  $\text{H}_2\text{O}$ 의 온도에 따른 밀도를 나타낸 것이고, 자료는 서로 다른 온도의  $\text{H}_2\text{O}$  (가)~(다)에 대한 설명이다.



- (가)~(다)의 온도는  $-4^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 에 속하고, (다)의 온도가 가장 높다.
- 온도를 낮추면 (나)의 밀도가 커진다.
- 단위 부피당 분자 수는 (가) = (다) > (나)이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. (가)는 고체 상태이다.
- ㄴ. 분자 간 평균 거리는 (가) > (나)이다.
- ㄷ. 분자당 평균 수소 결합 수는 (나) > (다)이다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 서로 다른 농도의 A(aq) (가)와 (나)를 혼합한 후, 물을 추가하여 (다)를 만드는 모습을 나타낸 것이다. A의 화학식량은 40이다.



(가)의  $w$ 는?

- ① 46      ② 50      ③ 54      ④ 60      ⑤ 92

11. 표는 1 atm에서 물의 질량이 각각 같은 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

수용액	용질의 질량(g)		끓는점 오름(°C)
	A	B	
(가)	20	0	$2a$
(나)	0	10	①
(다)	10	20	$7a$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 비휘발성, 비전해질이고 서로 반응하지 않으며, 수용액은 라울 법칙을 따른다.)

<보기>

- ㄱ. ① =  $3a$ 이다.
- ㄴ. 용질의 화학식량은 B가 A의 3배이다.
- ㄷ. (가)와 (나)를 혼합한 수용액의 끓는점 오름은  $5a^{\circ}\text{C}$ 이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 과학탐구 영역

화학 II

3

12. 다음은 학생이 반응 엔탈피( $\Delta H$ )와 관련하여 수행한 실험이다.

[가설]

- NaOH(s)과 HCl(aq)이 반응하여 NaCl(aq)과 H<sub>2</sub>O(l)이 생성되는 반응에서 ①

[실험 과정]

- (가) 물 100 mL에 NaOH(s) 4 g을 녹인 반응의  $\Delta H$ 를 구한다.  
 (나) (가)의 용액에 1 M HCl(aq) 100 mL를 혼합한 반응의  $\Delta H$ 를 구한다.  
 (다) 물 100 mL에 1 M HCl(aq) 100 mL를 넣은 후, NaOH(s) 4 g을 혼합한 반응의  $\Delta H$ 를 구한다.

[실험 결과]

- 각 과정에서 구한  $\Delta H$

과정	(가)	(나)	(다)
$\Delta H$	$\Delta H_1$	$\Delta H_2$	$\Delta H_3$

- $\Delta H_1 < 0$ 이고,  $\Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta H_3$ 이다.

[결론]

- 가설은 옳다.

학생의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, NaOH의 화학식량은 40이고, 압력은 일정하며 온도에 따른  $\Delta H$ 의 변화는 없다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. ‘반응 엔탈피 총합은 반응 경로에 관계없이 일정하다.’는 ⑦으로 적절하다.  
 ㄴ. (가)의 반응에서 반응물의 엔탈피 합은 생성물의 엔탈피 합보다 크다.  
 ㄷ. (다)에서 NaOH(s) 4 g 대신 NaOH(s) 8 g으로 실험한 반응의  $\Delta H$ 는  $2\Delta H_3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 학생에게 제시된 과제이다.

[과제]

$t^{\circ}\text{C}$ 의 0.1 m A(aq) 100 g에 녹아 있는 A의 질량을 구하시오.  
 단, 아래에 제시된 자료만을 이용하시오.

\* 자료

- A의 화학식량 ( $M_A$ )
- H<sub>2</sub>O의 분자량 ( $M_{H_2O}$ )
- $t^{\circ}\text{C}$ 에서 0.1 m A(aq)의 밀도 ( $d$ )

학생이 과제를 해결하기 위해 반드시 이용해야 할 자료만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ.  $M_A$  ㄴ.  $M_{H_2O}$  ㄷ.  $d$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 표는 같은 질량의 용질 A가 각각 녹아 있는 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
물의 질량(g)	w	$w + x$	$w + 3x$
기준 어는점(°C)	⑦	-0.2k	-0.1k


⑦은? (단, A는 비휘발성, 비전해질이고, 물의 몰랄 내림 상수 ( $K_f$ )는  $k^{\circ}\text{C}/m$ 이며, 수용액은 라울 법칙을 따른다.) [3점]

- ① -0.6k ② -0.5k ③ -0.4k ④ -0.3k ⑤ -0.25k

15. 다음은 삼투압과 관련된 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가)  $t^{\circ}\text{C}$ 에서 반투막으로 한 면을 막은 깔때기 관에 a M A(aq), b M B(aq)을 각각 넣은 후, 물이 들어 있는 수조에 그림과 같이 넣었다.  
 (나) 충분한 시간이 흐른 후, 물과 수용액의 수면 높이 차( $h$ )를 측정하였더니 그림과 같았다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 대기압은 일정하고, A와 B는 비휘발성, 비전해질이며 수용액은 라울 법칙을 따른다. 온도, 농도 변화에 따른 수용액의 밀도 변화와 물의 증발은 무시한다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. (나)에서 A(aq)의 몰 농도는 a M보다 작다.  
 ㄴ.  $b > a$ 이다.  
 ㄷ. 온도를  $t^{\circ}\text{C}$  대신  $2t^{\circ}\text{C}$ 로 높여 과정 (가)와 (나)를 반복하면 (나)에서 물과 B(aq)의 수면 높이 차는  $h_2$ 보다 커진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 25°C, 1 atm에서 CH<sub>4</sub>(g)와 관련된 반응의 열화학 반응식과 4가지 결합의 결합 에너지에 대한 자료이다.



결합	C-H	O=O	C-O	O-H
결합 에너지 (kJ/mol)	410	500	x	460

이 자료로부터 구한 x는?

- ① 120 ② 200 ③ 240 ④ 325 ⑤ 650


## 4 (화학 II)

# 과학탐구 영역

17. 다음은 기체와 관련된 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가)  $T\text{ K}$ 에서 그림과 같이 피스톤으로 분리된 실린더 I, II에 A( $g$ ), B( $g$ )를 각각 넣었다.




(나) 실린더 I에 B( $g$ )  $5w\text{ g}$ 을 첨가하고 충분한 시간이 흐른 후, 실린더 II 속 기체의 부피를 측정하였더니 3 L이었다.

(다) 온도를  $2T\text{ K}$ 으로 높여 유지하며 충분한 시간이 흐른 후, 실린더 I 속 A( $g$ )의 부분 압력을 측정하였더니  $P\text{ atm}$  이었다.

$\frac{\text{B의 분자량}}{\text{A의 분자량}} \times P$ 는? (단, A와 B는 반응하지 않으며, 피스톤의 마찰은 무시한다.) [3점]

- ①  $\frac{8}{15}$     ②  $\frac{16}{15}$     ③  $\frac{20}{3}$     ④  $\frac{40}{3}$     ⑤  $\frac{80}{3}$

18. 그림은 1 atm에서 용매 X( $l$ )와 Y( $l$ )에 용질 A를 각각 녹여 만든 용액 (가)와 (나)를 가열할 때, 가열 시간에 따른 용액의 온도를 나타낸 것이다.  $t\text{ }^\circ\text{C}$ 에서 용매의 몰 분율은 (가)와 (나)가 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y의 온도에 따른 증기 압력 곡선은 교차하지 않고, A는 비휘발성, 비전해질이며 용액은 라울 법칙을 따른다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. a일 때 용매의 몰 분율은 (가) > (나)이다.
- ㄴ. b일 때 용액의 증기 압력은 (가) = (나)이다.
- ㄷ. 분자 간 인력의 크기는 X( $l$ ) > Y( $l$ )이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 표는 온도  $T$ 에서 A( $g$ )와 B( $g$ )에 대한 자료이다.


기체	양(mol)	질량 압력(g/atm)	밀도(g/L)
A( $g$ )	$2n$	$a$	$3d$
B( $g$ )	$3n$	$a$	$8d$

$\frac{\text{A}(\text{g})\text{의 압력}}{\text{B}(\text{g})\text{의 압력}}$  은?

- ①  $\frac{1}{4}$     ②  $\frac{1}{2}$     ③ 1    ④ 2    ⑤ 4


20. 다음은 기체와 관련된 실험이다.

[화학 반응식]



[실험 과정]

(가) 꼭지로 분리된 강철 용기와 실린더에 A( $g$ ), B( $g$ ), He( $g$ )를 그림과 같이 넣는다.



(나) 꼭지를 열어 반응을 완결시키고 충분한 시간이 흐른 후 꼭지를 닫는다.

(다) B( $g$ ) 0.8 L 대신 B( $g$ ) 3 L로 과정 (가)와 (나)를 반복한다.

[실험 결과]

○ 각 과정 후 기체에 대한 자료

과정	C의 몰 분율	He의 부분 압력(atm)	실린더 속 기체의 부피(L)
(나)	㉠	$\frac{1}{2}$	$V$
(다)	$\frac{1}{3}$		$2V$

㉠은? (단, 대기압과 온도는 일정하고, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.) [3점]

- ①  $\frac{1}{3}$     ②  $\frac{2}{5}$     ③  $\frac{1}{2}$     ④  $\frac{2}{3}$     ⑤  $\frac{4}{5}$

\* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.