

• 수학 영역 •

정답

1	(4)	2	(2)	3	(5)	4	(4)	5	(1)
6	(3)	7	(5)	8	(1)	9	(2)	10	(3)
11	(4)	12	(3)	13	(3)	14	(1)	15	(3)
16	(1)	17	(2)	18	(4)	19	(5)	20	(4)
21	(2)	22	5	23	65	24	29	25	12
26	22	27	18	28	144	29	28	30	47

해설

1. [출제의도] 거듭제곱근 계산하기

$$\sqrt[3]{4} \times 2^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2^2} \times 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{2}{3} + \frac{1}{3}} = 2$$

2. [출제의도] 로그 계산하기

$$\log_3 24 + \log_3 \frac{3}{8} = \log_3 \left(24 \times \frac{3}{8} \right) = \log_3 3^2 = 2$$

3. [출제의도] 부채꼴의 반지름의 길이 계산하기

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ , 호의 길이를 l 이라 하면


$$l = r\theta \text{에서 } \frac{2}{3}\pi = r \times \frac{3}{4}\pi \text{이므로 } r = \frac{2}{3}\pi \times \frac{4}{3\pi} = \frac{8}{9}$$

4. [출제의도] 삼각함수가 포함된 방정식 이해하기

$$2\cos x + 1 = 0 \text{에서 } \cos x = -\frac{1}{2}$$

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 방정식 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 의 해는

함수 $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 과 만나는 점의 x 좌표와 같다.



$$\text{따라서 } x = \frac{2}{3}\pi$$

5. [출제의도] 상용로그의 성질 이해하기

수	...	4	5	6	...
:	:	:	:	:	:
4.26274	.6284	.6294	...
4.36375	.6385	.6395	...
4.46474	.6484	.6493	...

$$\log 43.5 = \log(4.35 \times 10) = \log 4.35 + 1$$

이고 상용로그표에서 $\log 4.35 = 0.6385$ 이므로 $\log 43.5 = 1.6385$

6. [출제의도] 사인법칙 이해하기

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6이므로 $\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2 \times 6 = 12$ 에서 $\overline{BC} = 12 \sin A = 12 \times \frac{1}{4} = 3$

7. [출제의도] 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 합수값 계산하기

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{이므로 } \cos \theta = -\frac{3}{4}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{7}{16}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \sin \theta > 0 \text{이므로 } \sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

8. [출제의도] 로그함수의 그래프 이해하기

함수 $y = \log_3(x+a)+b$ 의 그래프의 점근선이 직선

$$x = -4 \text{이므로 } a = 4$$

한편 점 $(5, 0)$ 이 그래프 위의 한 점이므로

$$0 = \log_3 9 + b, b = -2$$

따라서 $a+b=2$

9. [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기

함수 $y = \tan ax + b$ 의 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로 $b=2$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하므로 $a > 0$

$$\text{주기가 } 4\pi \text{이므로 } \frac{\pi}{a} = 4\pi, \text{ 즉 } a = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } ab = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$$

10. [출제의도] 지수함수의 역함수 이해하기

함수 $y = 5^x + 1$ 의 역함수의 그래프가 점 $(4, \log_5 a)$ 를 지나므로

함수 $y = 5^x + 1$ 의 그래프는 점 $(\log_5 a, 4)$ 를 지나다.

따라서 $4 = 5^{\log_5 a} + 1$ 이고 로그의 성질에 의하여 $a+1=4$ 이므로 $a=3$

11. [출제의도] 지수함수의 그래프 이해하기

함수 $y = 4^x - 6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타낸

함수는 $y = 4^{x-a} - 6 + b$ 이다.

이 함수의 그래프의 점근선이 직선 $y = -2$ 이므로 $-6+b=-2$,

$$b=4$$

한편 이 그래프가 원점을 지나므로

$$0 = 4^{-a} - 2,$$

$$a = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } ab = -\frac{1}{2} \times 4 = -2$$

12. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이용하여 함수의 최솟값 구하는 문제 해결하기

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \text{이므로}$$

$$f(x) = 2\cos^2 x + 2\sin x + k$$

$$= 2(1 - \sin^2 x) + 2\sin x + k$$

$$= -2\sin^2 x + 2\sin x + 2 + k$$

$\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = -2t^2 + 2t + 2 + k$$

$$= -2\left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) + \frac{5}{2} + k$$

$$= -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} + k$$

함수 $y = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} + k$ 는 $t = \frac{1}{2}$ 에서 최댓값

$\frac{5}{2} + k$ 를 갖는다. 따라서 $\frac{5}{2} + k = \frac{15}{2}$, 즉 $k=5$

그러므로 함수 $y = -2t^2 + 2t + 7$ 은 $t = -1$ 에서 최솟값 $-2 \times (-1)^2 + 2 \times (-1) + 7 = 3$ 을 갖는다. 즉 $f(x)$ 의 최솟값은 3이다.

13. [출제의도] 지수함수가 포함된 부등식 이해하기

$$2^{2x+3} + 2 \leq 17 \times 2^x,$$

$$2^{2x+3} - 17 \times 2^x + 2 \leq 0$$

에서 $2^x = t$ ($t > 0$)이라 하면

$$8t^2 - 17t + 2 \leq 0,$$

$$(t-2)(8t-1) \leq 0,$$

$$\frac{1}{8} \leq t \leq 2,$$

$$2^{-3} \leq 2^x \leq 2^1,$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

이고 이를 만족시키는 모든 정수 x 의 값은 $-3, -2, -1, 0, 1$ 이므로 개수는 5이다.

14. [출제의도] 로그의 정의 이해하기

$$\log_a(x^2 + ax + a + 8) \text{이 정의되기 위해서는}$$

$$a > 0, a \neq 1, x^2 + ax + a + 8 > 0$$

이어야 한다.

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 + ax + a + 8 > 0$ 이 성립하기 위해서는 이차방정식 $x^2 + ax + a + 8 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = a^2 - 4(a+8) = a^2 - 4a - 32 = (a+4)(a-8) < 0,$$

$$\therefore -4 < a < 8 \text{이어야 한다.}$$

따라서 $a > 0, a \neq 1, -4 < a < 8$ 을 모두 만족시키는 모든 정수 a 의 값의 합은

$$2+3+4+5+6+7=27$$

15. [출제의도] 삼각함수의 정의 이해하기

점 A의 좌표를 $(-2, a)$ ($a > 0$)이라 하면

점 B의 좌표는 $(-2, -a)$ 이고 $\overline{OA} = \overline{OB} = r$ 이므로

$$\cos \alpha = -\frac{2}{r}, \sin \beta = -\frac{a}{r}$$

$2 \cos \alpha = 3 \sin \beta$ 에서

$$2 \times \left(-\frac{2}{r}\right) = 3 \times \left(-\frac{a}{r}\right),$$

$$a = \frac{4}{3}$$

$$\text{한편 } \sin \alpha = \frac{a}{r}, \cos \beta = -\frac{2}{r} \text{이므로}$$

$$r(\sin \alpha + \cos \beta) = r \left\{ \frac{a}{r} + \left(-\frac{2}{r}\right) \right\}$$

$$= a + (-2) = \frac{4}{3} + (-2)$$

$$= -\frac{2}{3}$$

16. [출제의도] 삼각형의 넓이와 코사인법칙을 활용하여 선분의 길이의 합 구하는 문제 해결하기

$\angle DAB = \theta$ 라 하면

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{4^2 + 5^2 - (\sqrt{33})^2}{2 \times 4 \times 5} = \frac{1}{5}$$

사각형 ABCD가 한 원에 내접하므로

$\angle BCD = \pi - \$

(iii) 곡선 $y = 3^x - n$ 이 점 $(4, 4)$ 를 지나면
 $4 = 3^4 - n$ 에서 $n = 77$ 이므로 $g(77) = 4$
 $3 = g(24) < g(25) < \dots < g(76) < g(77) = 4$
 따라서 $24 \leq n \leq 76$ 일 때,
 $3 \leq g(n) < 4$ 이므로 $h(n) = 3$
(iv) 곡선 $y = 3^x - n$ 이 점 $(5, 5)$ 를 지나면
 $5 = 3^5 - n$ 에서 $n = 238$ 이므로 $g(238) = 5$
 $4 = g(77) < g(78) < \dots < g(237) < g(238) = 5$
 따라서 $77 \leq n \leq 237$ 일 때,
 $4 \leq g(n) < 5$ 이므로 $h(n) = 4$
(i)~(iv)에 의하여 $h(n) < h(n+1)$ 을
 만족시키는 $2 \leq n \leq 100$ 인 모든 n 의 값의 합은
 $6 + 23 + 76 = 105$ 이다.

22. [출제의도] 지수 계산하기

$$(5^{2-\sqrt{3}})^2 + \sqrt{3} = 5^{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = 5^1 = 5$$

23. [출제의도] 로그함수가 포함된 방정식의 해 계산하기

$$\log_4(x-1)=3 \text{에서 } x-1=4^3=64 \text{ 이므로 } x=65$$

24. [출제의도] 로그함수의 그래프 이해하기

$0 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+3) + 30$ 은
 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하므로
 $x=0$ 에서 최댓값을 갖는다. 따라서 최댓값은
 $\log_{\frac{1}{3}}3 + 30 = \log_{\frac{1}{3}}3 + 30 = -\log_3 3 + 30 = 29$ 이다.

25. [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기

$$y = 6 \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + k = -6 \sin x + k \text{ 이고}$$

이 함수의 그래프가 점 $\left(\frac{5}{6}\pi, 9\right)$ 를 지나므로
 $9 = -6 \sin \frac{5}{6}\pi + k$,
 $9 = -3 + k$, $\therefore k = 12$

26. [출제의도] 거듭제곱근의 정의를 이용하여 자연수의 합 추론하기

자연수 n 에 대하여 $\sqrt[n+1]{8}$ 이
 어떤 자연수의 네제곱근이 되려면
 $(\sqrt[n+1]{8})^4 = \left((2^3)^{\frac{1}{n+1}}\right)^4 = 2^{\frac{12}{n+1}}$ 이
 자연수이어야 한다.
 따라서 $n+1$ 은 12의 약수이어야 하므로
 $n+1$ 이 될 수 있는 값은 2, 3, 4, 6, 12 이고
 이를 만족시키는 모든 n 의 값의 합은
 $1+2+3+5+11=22$ 이다.

27. [출제의도] 로그의 성질을 이용하여 식의 값 구하는 문제 해결하기

주어진 식에서 로그의 밑을 c 로 모두 변환하면
 $\log_a b = 81$ 에서 $\frac{\log_c b}{\log_c a} = 81$ 이므로
 $\log_c b = 81 \times \log_c a \quad \text{… } \textcircled{1}$
 $\log_c \sqrt{a} = \log_{\sqrt{b}} c$ 에서
 $\frac{1}{2} \log_c a = \frac{1}{\log_c \sqrt{b}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \log_c b}$ 이므로
 $4 = \log_c a \times \log_c b \quad \text{… } \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 $(\log_c b)^2 = 4 \times 81$ 이고
 b 와 c 는 1보다 큰 실수이므로 $\log_c b > 0$
 따라서 $\log_c b = 18$

28. [출제의도] 이차함수와 로그함수의 그래프를 이용하여 식의 값 구하는 문제 해결하기

$0 \leq x < 3$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과


만나는 점의 x 좌표는 방정식 $a(4-x^2)=0$ 의 실근과 같으므로 점 A의 좌표는 $(2, 0)$ 이다.

$\overline{AB}=10$ 이므로 점 B의 좌표는 $(12, 0)$ 이다.

$f(12)=0$ 이므로

$$b \log_2 \frac{12}{3} - 5a = 0,$$

$$2b = 5a$$



$0 \leq x < 3$ 에서 $-5a < f(x) \leq 4a$ 이고

$$f(b) = 2b = 5a > 4a \text{ 이므로 } b > 3$$

$$\text{그러므로 } f(b) = b \log_2 \frac{b}{3} - 5a = 2b,$$

$$b \log_2 \frac{b}{3} - 2b = 2b, \log_2 \frac{b}{3} = 4,$$

$$b = 3 \times 2^4 = 48, 5a = 2b = 96$$

$$\text{따라서 } 5a+b = 96+48 = 144$$

29. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 선분의 길이의 합 구하는 문제 해결하기

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R_1, R_1 = \frac{\overline{BC}}{2 \sin A}$$

삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin A} = 2R_2, R_2 = \frac{\overline{BD}}{2 \sin A}$$

$$R_1 : R_2 = 4 : 3 \text{ 이므로}$$

$$\frac{\overline{BC}}{2 \sin A} : \frac{\overline{BD}}{2 \sin A} = 4 : 3, \therefore$$

$$\overline{BC} : \overline{BD} = 4 : 3$$

$$\overline{BC} = 4k, \overline{BD} = 3k (k > 0) \text{이라 하면}$$

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle CDB) = \frac{(2\sqrt{7})^2 + (3k)^2 - (4k)^2}{2 \times 2\sqrt{7} \times 3k} = \frac{-7k^2 + 28}{12\sqrt{7}k}$$

이고

$$\cos(\angle CDB) = \cos(\pi - \angle BDA)$$

$$= -\cos(\angle BDA) = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

이므로

$$\frac{-7k^2 + 28}{12\sqrt{7}k} = -\frac{\sqrt{7}}{4},$$

$$7k^2 - 21k - 28 = 7(k+1)(k-4) = 0$$

$$k > 0 \text{ 이므로 } k = 4$$

$$\text{따라서 } \overline{BC} + \overline{BD} = 4k + 3k = 28$$

30. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이용하여 조건에 맞는 함수 추론하기

함수 $y = 2 \sin \frac{\pi}{k} x$ 의 주기가 $2k$ 이고,


$$-2 \leq 2 \sin \frac{\pi}{k} x \leq 2 \text{ 이므로}$$

$$-\frac{3}{2} \leq 2 \sin \frac{\pi}{k} x + \frac{1}{2} \leq \frac{5}{2}$$

한편 $k > 1$ 이므로 $3k > 2k+1$ 이고

$$0 \leq x \leq 2k+1 \text{에서}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$0 \leq t < k$ 또는 $t > 2k+1$ 이면

$t \leq x \leq t+1$ 에서 $f(x) > \frac{1}{2}$ 인 x 의 값이 존재하므로

$f(x)$ 의 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 보다 크다.

$t = \alpha, t = \beta$ 일 때 $t \leq x \leq t+1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 $\frac{1}{2}$ 이므로 $k \leq \alpha < \beta \leq 2k+1$

한편 $f(x) = \frac{1}{2}$, 즉 $\left|2 \sin \frac{\pi}{k} x + \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$ 에서

$\sin \frac{\pi}{k} x = 0$ 또는 $\sin \frac{\pi}{k} x = -\frac{1}{2}$ 이므로

$k \leq x \leq 2k$ 에서 $f(x) = \frac{1}{2}$ 의 해는

$x = k$ 또는 $x = 2k$ 또는 $x = \frac{7}{6}k$ 또는 $x = \frac{11}{6}k$ 이다.

따라서 직선 $y = \frac{1}{2}$ 이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 x 좌표는 $k, \frac{7}{6}k, \frac{11}{6}k, 2k$ 이다.

$\frac{7}{6}k - k = 2k - \frac{11}{6}k = \frac{k}{6}$ 이고

$t \leq x \leq t+1$ 에서 $(t+1)-t=1$ 이므로 다음과 같은 세 가지 경우로 나눌 수 있다.

(i) $\frac{k}{6} > 1$ 일 때,

$$k \leq x \leq k+1 \text{에서 } f(x) \leq f(k) = \frac{1}{2},$$

$$\frac{7}{6}k - 1 \leq x \leq \frac{7}{6}k \text{에서 } f(x) \leq f\left(\frac{7}{6}k\right) = \frac{1}{2},$$

$$\frac{11}{6}k \leq x \leq \frac{11}{6}k + 1 \text{에서 } f(x) \leq f\left(\frac{11}{6}k\right) = \frac{1}{2},$$

$$2k - 1 \leq x \leq 2k \text{에서 } f(x) \leq f(2k) = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$t \leq x \leq t+1$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값이 $\frac{1}{2}$ 이

되도록 하는 서로 다른 t 의 값은

$$k, \frac{7}{6}k - 1, \frac{11}{6}k, 2k-1 \text{이다.}$$

따라서 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $\frac{k}{6} = 1$ 일 때,

$$k = 6, \frac{7}{6}k = 7, \frac{11}{6}k = 11, 2k = 12 \text{ 이므로}$$

$$6 \leq x \leq 7 \text{에서 } f(x) \leq f(6) = \frac{1}{2},$$

$$11 \leq x \leq 12 \text{에서 } f(x) \leq f(11) = \frac{1}{2}$$

따라서 $t \leq x \leq t+1$ 에서

$f(x)$ 의 최댓값이 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 하는 모든 t 의 값은 6, 11 이다.

(iii) $\frac{k}{6} < 1$ 일 때,

$$k+1 > \frac{7}{6}k, \frac{7}{6}k-1 < k,$$

$$\frac{11}{6}k+1 > 2k, 2k-1 < \frac{11}{6}k \text{ 이므로}$$

$$t \leq x \leq t+1 \text{에서 } f(x) \text{의 최댓값이 } \frac{1}{2} \text{ 이}$$

되도록 하는 t 의 값은 존재하지 않는다.

따라서 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 $k=6, \alpha=6, \beta=11$ 이므로

$$k\alpha + \beta = 6 \times 6 + 11 = 47$$